



# Azaka®

Svampemiddel



Effektivt til bekæmpelse af rust i kornafgrøder og svampesygdomme i raps

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - TRITICALE - RUG - VINTERRAPS - VÅRRAPS

REGISTRERINGSNUMMER	11-56		
AKTIVSTOF	250 g/kg azoxystrobin	FRAC Group	11
FORMULERING	Suspensionskoncentrat (SC)		
DOSERING	1 l/ha		
EMBALLAGE	5 l		

## PRODUKTEGENSKABER:

- Økonomisk svampebekæmpelse i korn og raps
- Effektiv imod knoldbægersvamp og skulpesvamp
- God effekt på rustsygdomme i korn
- God nettoøkonomi ved anvendelse af azoxystrobin i raps
- Vedligeholdelse af plantens grønne bladareal
- Syntetiseret udgave af naturligt fungicid
- Moderne SC-formulering.

## ANVENDELSE

Azaka® må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, tritcale, byg, rug og raps.

## VIRKEMÅDE


Azoxystrobin tilhører gruppen af Qo- inhibitor-fungicider (QoI). QoI-fungiciderne virker i Quinone bindingsstedet i cyto-chrom bc1 komplekset. Herved inhiberes patogenets mitochondria ånding, hvilket hæmmer sporespiring og myceliets vækst. Azoxystrobin virker både profylaktisk og kurativ på en lang række patogener. Azoxystrobin er et systemisk og tranlaminar aktivstof. Azoxystrobin optages igennem bladets overflade eller igennem rødderne, og translokeres igennem xylemet til stængel og blade.



AFGRØDER	SKADEGØRERE	DOSERING L/HA	BEMÆRKNINGER
Vinterhvede, triticale, vinterbyg og rug	<u>Moderat til fuld effekt:</u> Gulrust Brunrust Bygrust Bygbladplet <u>Positiv sideeffekt:</u> Skoldplet Hvedebladplet Bygmeldug	0,4 – 1,0 l/ha	Afhængig af dosering og sprøjtetidspunkt opnås moderat til fuld effekt. I de tidlige vækststadier kan Azaka® kun anvendes med reduceret dosering. BBCH 31-33: 0,4 l/ha BBCH 37-69: 1,0 l/ha. Der kan maksimalt anvendes 1,0 l/ha per sæson
Vårbyg og vårhvede	<u>Moderat til fuld effekt:</u> Gulrust Brunrust Bygrust Bygbladplet <u>Positiv sideeffekt:</u> Skoldplet Hvedebladplet Bygmeldug	0,4 – 1,0 l/ha	Afhængig af dosering og sprøjtetidspunkt opnås moderat til fuld effekt. I de tidlige vækststadier kan Azaka® kun anvendes med reduceret dosering. BBCH 30-35: 0,4 l/ha BBCH 37-45: 0,8 l/ha BBCH 45-69: 1,0 l/ha Der kan maksimalt anvendes 1,0 l/ha per sæson
Raps	<u>Fuld effekt:</u> Knoldbæger-svamp Alternaria spp	2 x 0,5 l/ha eller 1 x 1,0 l/ha	Azaka® kan anvendes i BBCH 60-69. Der kan maksimalt anvendes 1,0 l/ha per sæson fordelt på 1 eller 2 sprøjtninger.

## FORSØG OG RESULTATER

### Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps 2016:



Kilde: Oversigt over landsforsøgene 2016, Tabel 11, Side 160, LSD: ns.

Andre registrerede varmærker:

FMC: Azaka®, Riza® 200 EC; Adama: Orius®, Mirador®, Mirador® Forte; Bayer: ProPulse®. BASF: Efilor®; Syngenta: Amistar®, Amistar® Gold.