

Vendetta®

Effektiv bekæmpelse af skimmel og alternaria

KARTOFLER



REGISTRERINGSNUMMER	11-58		
AKTIVSTOF	150 g/l azoxystrobin + 375 g/l fluazinam	FRAC Group	11+29
FORMULERING	Suspensionskoncentrat (SC)		
DOSERING	3 x 0,5 l/ha		
EMBALLAGE	5 l		

PRODUKTEGENSKABER:

- Et aktivstof med systemisk virkning
- Et aktivstof med kontaktvirkning
- Bekæmpelse af kartoffelskimmel
- Bekæmpelse af kartoffelbladplet
- Nedsat risiko for resistens
- Unik kombination af aktivstoffer
- Synergistisk effekt af aktivstofferne.

ANVENDELSE

Vendetta® må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Vendetta® må anvendes i afgrødens vækststadiet (VS) 41 - 97. 1-2 behandlinger kan foretages før VS 59. 1-2 behandlinger kan foretages efter VS 59. Vendetta® må anvendes maksimalt 3 gange per sæson. Som minimum skal der være 7 dage mellem behandlingerne. Vendetta® må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

VIRKEMÅDE

Azoxystrobin inhiberer patogenets mitochondria ånding, hvilket hæmmer sporespiring og mycelie vækst. Azoxystrobin virker både profylaktisk og kurativ på en lang række patogener. Azoxystrobin er et systemisk og tranlaminar aktivstof. Azoxystrobin optages igennem bladets overflade eller igennem rødderne, og translokteres igennem xylemet til stængel og blade. Fluazinam er et ikke-systemisk, multisite svampemiddel med kontaktvirkning, der anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Fluazinam hindrer skimmelsporer i at spire på kartoffelbladene og nedsætter sporuleringen. Fluazinam har en særdeles god virkning overfor knoldskimmel. Fluazinam har forskellige virkemåder, blandt andet afkobling af oxidativ phosphorylering.

Vendetta® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.



AFGRØDER	SKADEGØRER	DOSERING	OBS!
Kartofler	<p>Kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Kartoffelbladplet (Alternaria solani & Alternaria alternata)</p>	<p>Maks. 3 gange per sæson i vækststadiet (VS) 41-97.</p> <p>1-2 behandlinger kan foretages inden vækststadiet VS 59 og 1-2 behandlinger efter VS 59, med samlet maks. 3 behandlinger.</p> <p>Enten: 1-2 x 0,5 l/ha ved VS 41-58 og 0,5 l/ha ved VS 59-97</p> <p>Eller: 0,5 l/ha ved VS 41-58 og 1-2 x 0,5 l/ha ved VS 59-97</p>	<p>Må kun bruges til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.</p> <p>Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides.</p> <p>Læs afsnittet om resistenshåndtering.</p>