

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS (421-2) i pastinak og persillerod

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. FMC Chemicals sprl kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Centium 36 CS (421-2) i pastinak og persillerod

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i pastinak og persillerod til bekæmpelse af ukrudt.
- Centium 36 CS anvendes før fremspiring
- Centium 36 CS eller et andet clomazonholdigt produkt må kun anvendes hvert 3. år på samme areal
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se Centium 36 CS etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Centium 36 CS i pastinak og persillerod

Skadegører: Ukrudt - se etiketten mht. effekt overfor de enkelte ukrudtsarter

Dosering:

Centium 36 CS	Dosis L/ha
1. sprøjtning	Max. 0,15Ll/ha

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Centium 36 CS anvendes efter såning, men før fremspiring. Bedst effekt opnås ved god jordfugtighed og et veltilberedt såbed uden knolde. Midlet skal ikke indarbejdes i jorden.

Antal behandlinger:

Centium 36 CS eller et andet clomazonholdigt produkt må kun anvendes hvert 3. år på samme areal.

Risiko for skade:

Centium 36 CS kan under uheldige vejræssige forhold skade kulturen, f.eks. i perioder med høj jordfugtighed og lav temperatur i det tidlige forår. Risikoen for skader øges hvis der samtidig blandes med andre jordherbicer. Pastinak er mere følsom for skader af Centium 36 CS end persillerod.

Dato: 06. februar 2017