

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS i urtechrysantemum til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Centium 36 CS i urtechrysantemum til frøavl

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i urtechrysantemum til frøavl.
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m. fra vandmiljøet (vandløb, søer m.m.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Produktet eller andre produkter der indeholder clomazon må maksimalt anvendes hvert 3. år på arealet.

Advarsel

"Se [Centium 36 CS](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Centium 36 CS i urtechrysantemum til frøavl

Bekæmpelse

Centium 36 CS har god effekt på burresterre, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.

Dosering

Der anvendes 0,25 liter Centium 36 CS pr. ha, efter såning og senest 3-5 dage før urtechrysantemumet spirer frem.

Centium 36 CS kan anvendes ved udlæg af urtechrysantemum om foråret.

Risiko for skade

For at mindske risikoen for skade skal frøene af urtechrysantemum være dækket af jord.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Centium 36 CS kan medføre skader på urtechrysantemum.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger

Bemærkning fra Aarhus universitet

Ingen bemærkninger.

Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Ingen bemærkninger.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 26. februar 2014